



MARCHÉ DU LAVABLE

La variété qui fait référence sur le marché du lavable, tant en clarté, qu'en potentiel de rendement et une véritable aptitude à la conservation.

Caractéristiques de la variété

- Croisement* 🟡 Hybride * Sirco.
- Maturité* 🟡 Hâtive à très hâtive.
- Tubercule* 🟡 Forme oblong, peau jaune et chair jaune pâle, yeux superficiels.
- Plante* 🟡 Feuillage vert assez clair, floraison pauvre, fleur blanche.
- Rendement* 🟡 Très élevé.
- Matière sèche* 🟡 De 17 à 18,5%.
- Qualité culinaire* 🟡 Bonne tenue à la cuisson, adaptée au four et potage..
- Dormance* 🟡 Faible notation 4 (1 très faible - 9 très forte).

Maladie

- Sensibilité* 🟡 Mildiou du feuillage.
- Résistance* 🟡 Très peu sensible au virus Yn, résistance à la galle verruqueuse et nématode doré.

Itinéraire technique

- Préparation du plant* 🟡 Ne pas trop anticiper la sortie du frigo par rapport à la plantation.
Ne pas traiter sur des plants humides (condensation).
Traiter anti-rhizoctone en association avec un mancozèbe (contre la gale argentée).

Fertilisation 🟡 Analyse reliquat azoté indispensable.

Besoins globaux : à déduire suivant les reliquats.

Azote : 220 unités 2 types de fertilisation en fonction du système :

En polyculture – élevage, apport à l'automne de 20 à 30 tonnes de fumier composté.

En polyculture sans élevage, 1 Tonne/ha de scories Thomas+Ca+Oligos.

3 à 4T/ha de vinasses de betteraves.

Acide phosphorique : 80 à 100 unités.

Potasse : 320 à 350 unités.

Plantation : 4 à 5 cm sous le niveau du sol.

Protection à la bouille bordelaise (réglementation: 6 kg de Cuivre/ha/an)

L'adhérence peut être améliorée par adjonction de mouillant (huiles végétales).

- Densité* 🟡 Sous irrigation : 28/35 : 40 à 42 000 pieds/ha.
35/50 : 36 à 37 000 pieds/ha.



Ces recommandations doivent être adaptées selon les régions de production, pour plus d'informations, contactez Thierry Rondeaux : thierry.rondeaux@desmazieres.fr