



**DEMI-HÂTIVE**

Variété bien adaptée à la frite de chair bien jaune.

## Caractéristiques de la variété

- Croisement* 🟡 Quarta\*Semlo.
- Maturité* 🟡 Mi tardive.
- Tubercule* 🟡 Forme oblong allongé, peau jaune et chair bien jaune.
- Plante* 🟡 Feuillage vert foncé, fleur blanche.
- Rendement* 🟡 Élevé.
- Matière sèche* 🟡 De 20 à 21%.
- Qualité culinaire* 🟡 Bonne tenue à la cuisson, bonne aptitude à la friture.
- Dormance* 🟡 Très bonne notation 8 (1 très faible - 9 très forte).

## Maladie

- Sensibilité* 🟠 Attention au coeur creux, respecter les densités.
- Résistance* 🟠 Peu sensible au virus Yn.

## Itinéraire technique

*Travail du sol et désherbage* 🟡 Passage de herse étrille pour désherber et démonter la butte.  
Deuxième buttage qui affine la terre, couvre et élimine les mauvaises herbes.  
Deuxième passage de herse étrille (avant le stade feuillage 10 cm de hauteur).  
Deux buttages successifs pour remonter la terre, couvrir et éliminer les mauvaises herbes.  
Désherbage manuel si nécessaire.

*Protection phytosanitaire* 🟡 Protection par la bouillie bordelaise.  
Différentes formulations : Sulfate de cuivre ou Oxychlorure.  
L'adhérence peut être améliorée par adjonction de mouillant (huiles végétales).  
Suivre les avertissements agricoles (dates de sporulation), travailler en préventif.  
Le cuivre a une action de contact. Le produit est lessivé à 20 mm de pluie.  
Renouveler dès que les 20 mm sont dépassées. (Réglementation : 6 Kg de cuivre/ha/an).

*Fertilisation* 🟡 Analyse reliquat azoté indispensable.  
Besoins globaux : à déduire suivant les reliquats.  
Azote : 1800 unités 2 types de fertilisation en fonction du système :  
En polyculture – élevage, apport à l'automne de 20 à 30 tonnes de fumier composté.  
En polyculture sans élevage, 1 Tonne/ha de scories Thomas+Ca+Oligos.  
3 à 4T/ha de vinasses de betteraves.  
Acide phosphorique: 80 à 100 Unités  
Potasse : 320 à 350 Unités  
Magnésie : 80 à 100 Unités

*Densité* 🟡 28/35 : 45 à 46 000 pieds/ha.  
35/50 : 38 à 40 000 pieds/ha.

Ces recommandations doivent être adaptées selon les régions de production,  
pour plus d'informations, contactez Thierry Rondeaux : [thierry.rondeaux@desmazieres.fr](mailto:thierry.rondeaux@desmazieres.fr)